

用法および用量

年齢区分、1回用量、1日の使用回数などが記載されています。正しく効果的に使うために、よくチェックしておきましょう。

使用方法など

必要に応じて、製品の取り出し方、使い方などが記載されている場合がありますので、使用する前によく読んでおきましょう。

用法・用量

- ノズル部分を肛門内に挿入し、全量をゆっくり注入すること。
(肛門内に注入する場合)

年齢	1回量	1日使用回数
成人(15歳以上)	1個	1~2回
15歳未満	使用しないこと	

または

- 次の量を患部に塗布すること。なお、一度塗布に使用したものは、注入には使用しないこと。(患部に塗布する場合)

年齢	1回量	1日使用回数
成人(15歳以上)	適量	1~3回
15歳未満	使用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 肛門部にのみ使用すること。
- 肛門内に注入する場合、ノズル部分のみを挿入して使用すること。
- 用法・用量を厳守すること。

注入軟膏の使用方法

~排便後、入浴後、あるいは寝る前に使用されると効果的です~
【肛門内に注入する場合】

1



キャップをはずし、軟膏をノズル先端部より少し出します。

2



ノズル部分を肛門内に挿入します。

3



ボディを押し込んでゆっくり注入し、押し込まないで引き抜いてください。

【患部に塗布する場合】



キャップをはずし、清潔な指に患部をおおう量の軟膏を取り、そのまま塗布するか、またはガーゼなどにのぼして患部に貼付してください。



軟膏が硬くて押し出しにくい場合

寒い時期や低温での保管により、軟膏が硬くなった場合は、容器を手で握ってあたためると柔らかくなります。

成分および分量

有効成分の名称や分量が記載されています。各成分がどのような効果を示されることもあります。

成分

1個(2g)中

はたらき	成分	含量
炎症をおさえ、出血、はれ、かゆみをしずめます。	プレドニゾン酢酸エステル	1mg
局所の痛み、かゆみをしずめます。	リドカイン	60mg
傷の治りをたすけ、組織を修復します。	アラントイン	20mg
末梢の血液循環をよくし、うっ血の改善をたすけます。	ビタミンE酢酸エステル (トコフェロール酢酸エステル)	50mg

添加物：白色ワセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、モノステアリン酸グリセリン

- 注入式のため、容器の中に薬剤が少量残りますが、残量を見込んで充填しています。

保管および取扱い上の注意

「直射日光の当たらない場所に保管すること」「小児の手の届かないところに保管すること」など、保管する際の注意事項が記載されています。保管方法によって品質に影響が出るものもあるため、必ず守るようにしましょう。

保管および取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- 使用済みの容器と袋は、トイレに流さないこと。
- 本剤は油脂性の軟膏であるため、衣類などに付着すると取れにくくなるので注意すること。

痔を予防するためのポイント

~健康な生活サイクルを守り、痔を予防しましょう~

- ①便通をよくするため、1日3食バランスよく食べましょう。



- ②おしりはいつも清潔にしましょう。特に入浴は肛門の血液循環をよくします。



- ③排便のとき、無理にいきまないようにしましょう。



消費者相談窓口

購入者等からの相談に応じるための窓口の連絡先担当部門の名称、電話番号、受付日時等が記載されています。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

天藤製薬株式会社「お客様相談係」
〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町一丁目5番3号
☎ 0120-932-904
受付時間：9：00～17：00（土、日、休、祝日を除く）

製造販売元 **天藤製薬株式会社**
〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町一丁目5番3号

製造販売業者の名称及び所在地

その医薬品の製造販売等に関わる業者の氏名又は名称及び住所が記載されています。

病気の予防・症状の改善につながる事項（いわゆる「養生訓」）

その医薬品の適用症状等に関連して、医薬品に頼るだけでなく、日常生活で、どのようなことに心がけるべきかなど、症状の予防・改善につながる内容が記載されています。薬の使用とともに、普段から生活にも気をつけるようにしましょう。