

痔の痛みに のんで効く薬です。

- つらい痛みを今すぐおさえたい
- いぼ痔を内側から対処したい
- 飲み薬で対処したい

△ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 胃腸の弱い人。(4) 高齢者。(5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(6) 次の症状のある人。むくみ(7) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つぼり感やごわごわに加え、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位(下腹部痛、痔、脱肛の痛みに服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

体力虚弱で、疲労しやすく血色のすぐれないものの次の諸症：月経痛、月経困難症、月経不順、腹痛、下腹部痛、腰痛、痔、脱肛の痛み、病後・術後の体力低下

用法・用量

次の量を食前または食間に水または白湯で服用すること。(食間とは、食後2～3時間を指します。)

年齢	1回量	1日服用回数
成人 (15歳以上)	1包	3回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- 用法・用量を厳守すること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本品1日量〔3包(1包1.5g)〕中
当帰建中湯エキス粉末2800mg

〔日局〕トウキ	2.0g
〔日局〕ケイヒ	2.0g
〔日局〕ショウキョウ	0.5g
〔日局〕タイソウ	2.0g
〔日局〕シャクヤク	2.5g
〔日局〕カンゾウ	1.0g

より抽出

添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、二酸化ケイ素

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり、品質が変わることがある)。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- 1包を分割したり残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。
- 本剤は天然物を原料としているため、色調、味又は香り等に多少の差異が出る場合がありますが、効果には変わりありません。

【お問い合わせ先】

天藤製薬株式会社 お客様相談係
〒560-0082
大阪府豊中市新千里東町一丁目5番3号
☎0120-932-904
受付時間 9:00～17:00(土、日、休、祝日を除く)