



2017年4月改訂

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。
また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。

痔の痛み・出血・はれ・かゆみに ボラギノール[®]A軟膏

痔 疾 用 外 用 薬

第2類医薬品

特 徴

- 4種の成分がはたらいて、痔による痛み・出血・はれ・かゆみにすぐれた効果を発揮します。
 - プレドニゾン酢酸エステルが出血、はれ、かゆみをおさえ、リドカインが痛み、かゆみをしずめます。
 - アラントインが傷の治りをたすけ組織を修復するとともに、ビタミンE酢酸エステルが血液循環を改善し、痔の症状の緩和をたすけます。
- 使いやすさを考え、なめらかですべりのよい油脂性基剤を使用しています。
 - 刺激が少なく、油脂性基剤が傷ついた患部を保護します。
 - 白色~わずかに黄みをおびた白色の軟膏です。

プレドニゾン酢酸エステル
抗炎症作用

+

リドカイン
鎮痛・鎮痒作用

+

アラントイン
組織修復作用

+

ビタミンE酢酸エステル
血液循環改善作用



痔の症状を改善
(痛み・出血・はれ・かゆみに)

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 次の人は使用しないこと
 - (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 患部が化膿している人。
- 長期連用しないこと



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状 |
|------|--------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |
| その他 | 刺激感、化膿 |

- 10日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

効 能

いぼ痔・きれ痔(さけ痔)の痛み・出血・はれ・かゆみの緩和

用法・用量


次の量を患部に直接塗布するか、またはガーゼなどにのばして患部に貼付すること。

| 年 齢 | 1回量 | 1日使用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 成人(15歳以上) | 適量 | 1~3回 |
| 15歳未満 | 使用しないこと | |

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 肛門部にのみ使用すること。
- (2) 用法・用量を厳守すること。

チューブ穴の開け方



キャップを逆にして、キャップの突起部をチューブの先に強く押し当ててください。

(裏面へ続く)

軟膏の使用方法



清潔な指に、患部をおおう量の軟膏を取り、そのまま塗布するか、またはガーゼなどにのぼして患部に貼付してください。

軟膏が硬くて押し出しにくい場合

寒い時期や低温での保管により、軟膏が硬くなった場合は、チューブを手で握ってあためると軟らかくなります。

成分 1g中

| はたらき | 成分 | 含量 |
|---------------------------|--------------------------------|-------|
| 炎症をおさえ、出血、はれ、かゆみをしずめます。 | プレドニゾン酢酸エステル | 0.5mg |
| 局所の痛み、かゆみをしずめます。 | リドカイン | 30mg |
| 傷の治りをたすけ、組織を修復します。 | アラントイン | 10mg |
| 末梢の血液循環をよくし、うっ血の改善をたすけます。 | ビタミンE酢酸エステル (トコフェロール酢酸エステル) | 25mg |

添加物：白色ワセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、モノステアリン酸グリセリン

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- (5)本剤は油脂性の軟膏であるため、衣類などに付着すると取れにくくなることもあるので注意すること。
- (6)チューブを繰り返し折り曲げないこと(破れの原因となる)。

包装 6g×2本・20g (チューブ入)

痔を予防するためのポイント

～健康な生活サイクルを守り、痔を予防しましょう～



①便通をよくするため、1日3食バランスよく食べましょう。



②おしりはいつも清潔にしましょう。特に入浴は肛門の血液循環をよくします。



③排便のとき、無理にいきまないようにしましょう。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

天藤製薬株式会社「お客様相談係」

〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町一丁目5番3号 ☎ 0120-932-904

受付時間：9：00～17：00（土、日、休、祝日を除く）

製造販売元 あま とう 天藤製薬株式会社

〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町一丁目5番3号